

如果您有任何副作用，請諮詢您的醫生，藥劑師或護士，其中包括本卡中未列出的任何副作用。

Enspryng® 開始日期：

醫生的電話號碼：

醫生的姓名：

病人的姓名：

聯絡信息



重要安全信息 適用於 ENSPRYNG® (Satralizumab) 病人資料卡



請出示此卡給任何替你會診的醫生

Enspryng® 可能會降低您抵抗感染的能力。

如果您感到不適或有感染跡象（發燒與否），請立即致電醫生，例如：

- 發冷，感到疲倦，肌肉酸痛，持續咳嗽或喉嚨痛
- 皮膚發紅，腫脹，壓痛或身體疼痛
- 腹瀉，肚痛或作嘔
- 小便時疼痛或尿頻

這是因為如果您有感染（包括感冒），則可能需要推遲注射下一劑的 Enspryng®。

給治療醫生的信息

此患者正使用 Enspryng® (satralizumab) - 這可能會使他們更容易受感染。

- 如果懷疑感染，請立即進行會診。
- Enspryng®可以降低某些感染測試的水平，例如血液中中性粒細胞水平，C 反應蛋白。
- 盡快聯繫處方 Enspryng 的醫生-他們可能需要延遲給予 Enspryng，直到感染得到控制。

有關 Enspryng®的更多信息，請參閱其處方信息。

請透過電郵向羅氏大藥廠藥物安全部

(hong_kong.drug_safety@roche.com)報告不良反應，這有助我們盡快認知更多關於本藥的安全資料。